

## II - VOYAGE ORNITHOLOGIQUE DANS LE SUD DU MASSIF CENTRAL

Itinéraire : du 30 Mars au 9 Avril 1958.

1ère journée : Ressouches-Chanac (Lozère)

2ème journée : Ressouches-Chanac-barraque de Latran-La Canourgue-Saint Antonin.

3ème journée : La Canourgue-Mende-Lac de Charpal et retour.

4ème journée : Ressouches-Marvejols-Nasbinal-Lac de l'Aubrac et retour.

5ème journée : Ressouches-Chanac.

6ème journée : Ressouches-Chanac-Sainte Enimie-La Malène-Les Vignes.

7ème journée : Sainte Enimie-Florac-les Vanelles-Meyruis.

8ème journée : Meyruis-le Rozier-Les Vignes-Point Sublime.

9ème journée : Point Sublime-Les Vignes -Le Rozier-Montpellier le Vieux-la Roque Sainte Marguerite-Cantobre-Trèves-Pas de l'Ase (canion du Trèvezel)

10ème journée : Pas de l'Ase-Bramabiau-Col de Faubel-Dourbies-Col de la Pierre Plantée-Trèves-Pas de l'Ase.

11ème journée : Trèves-Cantobre-Nant-Saint Jean du Bruel-Alzon-Blandas-Cirque de Navacelles (Gorges de la Vis).

Observations faites par :

J. LORDEZ, JF. & M. TERRASSE et B. TOUILLAUD.

---

La première partie de ce voyage a été consacrée à la région de Ressouches que nous avons sillonnée avec Monsieur DE LIGONNES qui a facilité pour une large part nos observations.

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES.-- Temps froid, gelées nocturnes fréquentes (-3 le 4 avril). Neige au-dessus de 900 m. Ciel nuageux avec éclaircies. Vent de secteur Nord.

Ces conditions peu favorables à l'arrivée des migrateurs et à la nidification ont sensiblement perturbé les observations. De plus l'époque un peu précoce nous interdisait l'observation d'un certain nombre d'espèces qui habitent cette région. La visite des vallées du Tarnon et du Fraissinet a été en outre perturbé par la pluie.

## ETUDES DES BIOTOPES

LACS ET MARAIS (Aubrac et Margeride) Ces régions de plateau d'altitude (900 à 1400 m.) très sauvages et vallonnées présentent un ensemble de landes tourbeuses à végétation rase de bruyère, joncs, carex, graminées et sphaignes ainsi que quelques pins rabougris.

De petites vallées sinueuses très marécageuses conduisent à des lacs profonds le plus souvent sans ceinture de végétation. De gros blocs de grès sont dispersés un peu partout.

Cette région mériterait une étude approfondie car à cette époque la plupart des oiseaux n'étaient pas arrivés. Un chasseur photographe de Mende y a observé (Lac de Charpal) au printemps le Courlis cendé, la Bécassine des marais, le Chevalier combattant, le Chevalier gambette. C'est le domaine du Pipit des prés, du pipit spioncelle, du Traquet motteux.

FORETS .- On peut distinguer plusieurs types :

Forêts de pins noirs : forêt artificielle, arbres jeunes le plus souvent. Le réboisement en Lozère est très important (terrain calcaire).

Forêt de l'Aigoual : visitée trop rapidement. Les peuplements divers de conifères sont de pins sylvestres, mélèzes et surtout de sapins pectinés. Pour les feuillus: surtout hêtres, bouleaux (terrain cristallin).

Forêt de châtaignier et de chêne (terrain cristallin) (Vallée du Tarnon, du Fraissinet). Cette végétation couvre des pentes de ravins à relief concave.

Forêt de pins sylvestres et sapins de la Margeride. C'est une vieille futaie avec de nombreux arbres morts (terrain cristallin).

## CAUSSE ET GARRIGUE

Le plateau et les pentes rocailleuses sont recouverts d'une très faible couche de terre arable sur le calcaire et son caractère est caractérisé par la présence de buis, genévriers, asphodèle, bouquets de pins clairsemés, chênes verts: c'est le biotope d'élection du Bruant fou, de l'Alouette lulu et localement du Traquet motteux et de la Fauvette passerinette.

## FALAISES ET BOULIS CALCAIRES

Espèces rupestres. Ici il s'agit d'un biotope de reproduction. On note : Aigle royal, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Grand Duc, Martinet alpin, Hironde de rocher, Crave à bec rouge, Choucas, Grand Corbeau, Merle de roche; Tichodrome échelette (en hivernage).

## BOCAGE DE VALLEE HUMIDE

Peupliers, Saules, Aulnes, haies vives et prairies  
Bruant zizi, Pics, Huppe fasciée

### LISTE DES ESPECES OBSERVEES

---

---

#### VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*)

Nous n'avons malheureusement pas observé ce grand rapace planeur qui nichait autrefois communément dans les gorges du Tarn. Mais nous avons appris que deux Vautours fauves avaient été vus pendant l'hiver 1958 sur le causse du Larzac. L'un d'eux qui s'est tué en heurtant une ligne électrique a été naturalisé. Il est très probable que cet oiseau ne niche plus dans la région des Causses.

#### AIGLE ROYAL (fauve) (*Aquila chrysaetos*)

Vallée du Tarn : Observation d'une aire à la partie supérieure d'une falaise de 50 m orientée vers l'est. Sous un grand surplomb s'ouvre un trou profond, de 3 m de diamètre, à moitié rempli par un énorme amas de branches.

200 m en amont existe une autre aire en moins bon état.

Vers 10 h. du matin, un adulte débouche du causse et descend vers la falaise en planant. Un serpent de 1 m. pend dans ses serres. Il se pose et le dévore. Il est très sombre sauf la nuque et les scapulaires jaune pâle.

Son repas terminé, il s'envole et se repose sur un autre petit rocher au pied de la falaise.

Enfin il s'envola, contourne le rocher et disparaît. Un quart d'heure plus tard, il revient, et traverse la vallée tenant quelque chose dans ses serres.

Le lendemain matin, à l'aube, il vole encore autour de l'aire.

Causse de Sauveterre : un couple d'adultes plane à la Barraque de Latran (sud est de la Canourgue)

Vallée de la Dourbie : un adulte très sombre et très grand s'envole du fond de la vallée et monte en planant jusqu'au Causse où il disparaît

(confluent de la Dourbie et du Trèvezel)

L'Aigle royal a considérablement diminué dans cette région : il ne niche plus dans la vallée du Lot, ni dans celle du Tarnon et il reste au grand maximum deux ou trois aires encore habitées dans le Sud du Massif Central. Malgré cela, il ne se passe pas d'année sans qu'un ou plusieurs Aigles soient tués... Il y a cependant un espoir : le département de la Lozère vient d'accorder à l'Aigle Royal une protection totale. La Lozère est donc le premier département français à prendre une telle mesure. Espérons que cette protection, qui s'impose, s'étendra très rapidement aux départements limitrophes, aux Alpes, aux Pyrénées, à la Corse car partout l'Aigle est menacé...

BUSE VARIABLE (*Butéo butéo*) : Observée presque partout. Dans la vallée du Lot (Ressouches) on peut noter environ un couple tous les kms ou tous les deux kms de vallée. Ailleurs la densité est plutôt faible.

EPERVIER (*Accipiter nisus*) : Peu fréquent : Observé dans la vallée du Lot (La Canourgue), dans la Dourbie (Cantobre).. Parade nuptiale d'un couple dans les gorges de la Vis au dessus d'un bois de pins noirs.

AUTOUR (*Accipiter gentilis*) : Une aire ancienne est à nouveau habitée dans la vallée du Lot (Ressouches) : Apport de branches vertes. La ponte n'est pas encore commencée. Il a été noté également sur le plateau de l'Aubrac (vol nuptial au dessus d'une forêt de pins sylvestres). Aussi à Saint Enimie (Pins noirs).

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) : Un couple noté près de la Canourgue (Vallée du Lot)

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) : Un individu près de la Canourgue

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*) : Un individu près de la Canourgue

BUSARD SAINT MARTIN (*Circus cyaneus*) : Un couple au lac de Charpal

CIRCAËTE JEAN LE BLANC (*Circaëtus gallicus*) : Bien répandu partout Vallée du Lot, vallée du Tarn, Florac, vallée de la Jonte, vallée du Trèvezel, gorges de la Vis.

Nous avons eu l'occasion d'observer un Circaète exécuter un "piqué" d'une très grande hauteur. Le couple chassait au dessus de Ressouches (vallée du Lot), les deux oiseaux faisant "le Saint Esprit". L'un d'eux volait donc sur place, absolument immobile depuis au moins 10 minutes quand il replia soudain les ailes pour se laisser tomber comme une pierre jusqu'au sol, soit une chute de près de 200 m.

FAUCON PELERIN (*Falco pérégrinus*) :  
Observation d'un adulte dans les gorges du Tarn (Saint Enimie)

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) : Commun dans tous les rochers : Plateau de l'Aubrac et de la Margeride (niche dans les fermes abandonnées). Vallée du Lot, Tarn, Jonte, Dourbie, Trèvezel, gorges de la Vis, Causse de Sauveterre etc... En général plus gros que dans la région parisienne.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) : Nous avons trouvé des traces de reposées et des fientes dans les versants ensoleillés et rocailleux, plusieurs fois au pied de falaises où nichaient les Grands Ducs.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : Vallée du Lot (falaises et vieux arbres), Ressouches, La Canourgue. (Nid en construction dans un saule)

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) : Plateau de l'Aubrac (Pins sylvestres), vallée du Lot, du Tarnon, de la Jonte.

CHOUETTE EFFRAIE (*Type alba*) : Des plumes dans une grotte près de Ressouches.

HIBOU GRAND DUC (*Bubo bubo*) : La myxomatose est certainement pour le Grand Duc, une cause de raréfaction. Néanmoins, il a été noté dans la vallée du Lot, du Tarn, Jonte, Trèvezel, gorges de la Vis. Sur le causse du Larzao, le Grand Duc habite les crevasses et les avens qui trouent le sol. Nous avons eu la joie de passer deux soirées chez les Grands Ducs, d'admirer cet immense oiseau, que l'ombre de la nuit naissante grandit encore. L'un d'eux vint même se percher à dix mètres au dessus de nous pour faire sa toilette et dévorer le ramier qu'il venait de prendre.

Nous avons noté dans cette falaise les restes de :

- 4 Grives (dont 1 mauvis) ; 3 Turdidés dans une pelotte
  - 3 Rats (*Epimys*) dans une autre pelotte
- |                  |                 |   |                   |
|------------------|-----------------|---|-------------------|
| Sur un "plumoir" | 1 Engoulevent   | } | Prises de la nuit |
|                  | 1 Pigeon ramier |   |                   |
|                  | 1 Merle noir    |   |                   |
|                  | 1 Grive draine  |   |                   |
|                  | 1 Renard        |   |                   |
|                  | 1 Rat, 6 lapins |   |                   |
- 
- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dans une autre aire | 1 Rat                      |
|                     | 2 Lapins                   |
|                     | 1 Oiseau de taille moyenne |

Durant notre séjour, les Grands Ducs ne chantaient plus. Nous avons seulement entendu trois "Bou Ho" lointains au crépuscule dans la vallée du Tarn.

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*) : Commune dans la vallée du Lot. Nombreux chants le soir

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) : Vallée du Lot, du Tarn (chants)

ENGOULEVENT (*Caprimulgus europaeus*) : 1 plumée dans l'aire de Grand Duc.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : Une quinzaine en migration vers le Nord dans la vallée d'Urugne (La Canourgue) le 31 mars. Plusieurs à Mende autour de la cathédrale le soir du même jour.

MARTINET ALPIN (*Apus melba*) : Les premiers sont notés à la Roque Sainte Marguerite (vallée de la Dourbie) le 7 avril. Aussi à Cantobre, gorges de la Vis.

MARTIN PECHEUR (*Alcedo atthis*) : Vallée du Lot, du Tarn.

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*) : Vallée du Lot, Plateau de l'Aubrac, Causse de Sauveterre.

PIC VERT (*Picus viridis*) : Commun et répandu dans toute la région (même dans le fond des gorges de la Vis)

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) : Egalement répandu, souvent dans les forêts de pins noirs.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) : Il a été noté nombreux autour de Ressouches (vallée du Lot) : Poursuites et parades nuptiales.

ALOUETTE LULU (*Lulula arboréa*) : Nombreuses dans la vallée du Lot ; notée sur le Causse de Sauveterre (Point Sublime). Cantonnée sur les versants montagneux rocaillieux, ensoleillés, en lisière de la forêt. Chante même la nuit.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) : Plateau de l'Aubrac et de la Margeride dans les landes tourbeuses. Causse de Sauveterre, Causse Noir.

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*) : Une le 3 avril à Ressouches

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Ptyonoprogne rupestris*) : Très commune partout : Vallée du Lot, du Tarn, de la Jonte, Dourbie, Trèvezel, Vis.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) : Commun. Le biotope d'élection pour l'emplacement du nid semble être les petites falaises au milieu des arbres, plutôt que les grandes parois de rochers. (Roches calcaires ou cristallines).

Vallée du Lot, Tarn, Jonte, Dourbie, Trèvezel.

La reproduction est très en retard : La ponte commence seulement fin mars, dans une aire près de Chanac. Pendant que la femelle couve, le mâle se tient à proximité, sur les arbres ou les rochers. L'aire est un volumineux tas de branches, qui dépasse largement du trou de la falaise.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*) : Partout, des landes marécageuses de l'Aubrac aux Causses et garrigues.

Abondance variable en rapport avec les prédateurs semble-t-il.

Dans une partie de la vallée du Lot où les Grands Ducs ont disparu, les Corvidés pullulent. Dans d'autres vallées où vivent les Grands Ducs, ils sont beaucoup plus rares.

CHOUCAS (*Coloeus monedula*) : Commun dans toutes les falaises : Vallée du Lot, Tarn, Jonte, Dourbie, Trèvezel, Vis...

PIE BAVARDE (*Pica pica*) : Partout, mais abondance variable.

GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*) : Dans la plupart des forêts surtout la vallée du Lot.

GRAVE A BEC ROUGE (*Coracia pyrrhocorax*) : Assez commun partout : noté dans les falaises du Lot, Tarn, Jonte, Dourbie, Trèvezel, à Bramabiau, gorges de la Vis. Sur le causse du Larzac, les craves vivent dans les avens et fissures du sol.

Par endroit, les couples sont isolés (vallée du Lot) (du Trèvezel).

Ailleurs on peut noter des grands rassemblements : plus de 50 dans une falaise du Cirque de Navacelles ; à Saint Enimie ; à Bramabiau, un couple construisait son nid dans une grotte qui s'ouvre au pied de la cassure du causse d'où sort la rivière souterraine, tandis qu'une troupe d'une vingtaine pâturait sur le Causse.

Souvent les Choucas et les Craves voisinent mais ne se mêlent pas. Dans les parois de rochers, les Craves se perchent au dessus des Choucas et dans les carrouselles, ils volent à part par couples ou par petits groupes, à la périphérie de la masse des Choucas, évoluant souvent à une vitesse et dans un sens différents de celui des Choucas.

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*) : Notée dans toutes les vallées (chants) - Causse de Sauveterre.

MESANGE BLEUE (*Parus ceruleus*) : Moins fréquente mais notée partout.

MESANGE NOIRE (*Parus ater*) : Dans toutes les forêts conifères. Certaines commencent à chanter mais les "rondes" ne sont pas encore dissociées.

MESANGE HUPPEE (*Parus palustris*) : Vallée du Lot (Ressouches)

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) : Notée dans les vallées.

SITELLE (*Sitta europea*) : Très commune dans la vallée du Lot (bocage) Un nid est en construction. Nombreux chants.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) : Vallée du Lot (Ressouches), du Tarn (Le Rozier), chants...

TICHODROME ECHELETTE (*Tichodroma muraria*) : Il a été noté dans la vallée du Lot (Ressouches), du Tarn (Saint Enemie), de la Jonte (Meyruis, les Douze) du Trèvezel (en aval de Trèves) ; pratiquement nous l'avons rencontré dans presque toutes les falaises où nous nous sommes arrêtés un peu longuement.

En général, dans les falaises exposées au midi, les oiseaux sont le plus souvent en plumage nuptial ; toujours isolés sauf une fois où Tichodromes (au moins 2) étaient dans le même groupe de rochers (les Douzes). Les falaises de cette région abritent donc une population d'hivernants importante.

TROGLODYTE (*Troglodytes troglodytes*) : Très commun partout.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) : On le trouve dans toutes les rivières (sauf plateau de l'Aubrac et de la Margeride) ; chante. Un nid est en construction au bord du Lot, sous un pont métallique.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : Très commune surtout sur les Causses.

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomélus*) : Notée à Ressouches (Vallée du Lot) dans des prés humides.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) : Partout mais faible densité.

MERLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) : Il a été noté une dizaine d'individus dans les falaises et des éboulis en amont de Meyruis (vallée de la Jonte). Le plumage nuptial est incomplet et ces oiseaux ne sont pas encore cantonnés.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) : il a été vu sur les plateaux de l'Aubrac (éboulis de grès) et ceux rocaillieux des alentours de Marvejols en Lozère.

ROUGE QUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) : Il est extrêmement répandu : falaises et fermes en ruine sur les Causses.

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) : Première observation près de Chanac le 3 avril. Puis il est noté dans la vallée du Tarn, au Point Sublime, ainsi qu'aux gorges de la Vis.

ROUGE GORGE (*Erithacus rubecula*) : Noté partout dans les vallées humides.

FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) : On entend partout de nombreux chants dans les vallées humides.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) : Une seule observation le 6 avril aux Douzes (vallée de la Jonte).

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) : Observée dans les chênes verts buissonnants des pentes de Navacelles où elle chante.

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) : noté son chant dans la vallée du Lot.

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*)

ROITELET TRIPLE BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) : tous deux chantent dans les vieux marronniers de Ressouches.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) : observé dans toutes les broussailles humides des vallées où il chante.

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) : Un individu dans les éboulis de rochers en amont de Meyruis (Vallée de la Jonte).

PIPIT DES PRES (*Anthus pratensis*) : Très communs sur les landes tourbeuses de l'Aubrac et de la Margeride.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) : Aubrac et Margeride, mais ils sont localisés sur les sommets parsemés de blocs de grès.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) : Plateau de l'Aubrac, gorges du Tarn.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) : observée sur toutes les rivières.

GROS BEC (*Coccothraustes coccothraustes*) : vallée du Lot.

VERDIER (*Chloris chloris*) : Vallée du Lot.

CHARDONNERET (*Carduelis carduelis*) : Vallée du Lot, Florac, Causse de Blandas.

TARIN (*Carduelis spinus*) : En bandes dans les aulnes au bord de l'eau : vallées du Lot, Tarn, Dourbie.

LINOTTE (*Carduelis cannabina*) : une petite bande dans une vigne près de Trèves (vallée de Trèvezel).

SERIN CINI (*Serinus canaria*) : Très commun partout : vallées et causses. Les mâles sont cantonnés et chantent sans arrêt.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) : c'est l'oiseau le plus souvent rencontré et dans tous les milieux (seul oiseau noté dans la forêt de l'Aigoual recouverte de neige).

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) : Un mâle à Ressouches (vallée du Lot) le 3 Avril.

BRUANT JAUNE (*emberiza citrinella*) : vallée de la Dourbie près de Nant ; Chanac.

BRUANT ZIZI (*Emberiza circlus*) : Très commun partout, vallées et causses, surtout dans les coteaux ensoleillés et rocailleux, les broussailles de buis.

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) : Très commun dans les coteaux rocailleux de la vallée du Lot.

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) : vallée du Lot ; très localisés.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) ;

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*)