

**NOTES ORNITHOLOGIQUES DE LOZÈRE
L'AUBRAC — LES GRANDS CAUSSES —
L'AIGOUAL. 4 — 14 JUIN 1968**

par S. KOWALSKI

Pendant 10 jours j'ai parcouru lentement l'Aubrac, les Grands Causses (C. de Sauveterre, C. Méjean, C. de Larzac) le versant occidental de la montagne de Lespérou et de l'Aigoual.

Me référant ensuite aux articles de Noël MAYAUD « Coup d'œil sur l'avifaune des Causses » (*Alauda* 1934) et de Gérard BERTHET « Notes de terrain sur l'avifaune des Causses » (*Alauda* 1947) qui relatent avec beaucoup de précisions toutes leurs observations dans cette région, je me suis aperçu que mes notes de terrain apportaient quelques espèces non signalées ou une différence évidente dans le statut de certaines autres.

Il semble d'ailleurs que l'Aubrac, partie Nord de la Lozère, le plus méridional des massifs volcaniques d'Auvergne, ait été délaissé. L'Aubrac est ce plateau long de 15 lieues et large de 13 qui se rattache vers l'Est, par un étroit pédoncule, au point culminant de la Margeride, le signal de Randon (1.554 m). Sur tout le reste de son pourtour, la Colagne, le Lot et la Truyère partagent en deux son ellipse irrégulière dont toutes les eaux descendent au Lot. C'est ainsi que E. A. MARTEL caractérise cette région qu'il appelle un désert d'herbe, un « Far West ». Ce désert d'herbe était, lors de mon passage, en pleine floraison et les vastes prairies, couvertes de narcisses, étaient ravissantes.

Vautour fauve et Percnoptère (*Gyps fulvus-Neophron percnopterus*).

Aucune observation. Les bergers, les gardes forestiers, les hôteliers interrogés en parlent au passé.

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*).

Un immature à l'Aigoual. La cocarde blanche, à la base des grandes rémiges était bien visible alors que la queue était entièrement sombre.

Buse variable (*Buteo buteo*).

Plus abondant que semble l'indiquer N. MAYAUD, car je l'ai noté en Aubrac vers le château de la Baume, au-dessus de Meyrueil, versant Causse Méjean et sur le versant de l'Aigoual, vers Valleraugue.

Milan royal (*Milvus milvus*).

Au-dessus de Chaudessaigue, dans les premiers lacets s'élevant vers l'Aubrac, un couple évoluait en même temps qu'un couple de Milans noirs, à mi-pente, visiblement attiré par le fond de la vallée où devait se trouver une charogne quelconque que situait un rassemblement de Corvidés.

Milan noir (*Milvus migrans*).

En plus du couple précité, un sujet au-dessus de la Dordogne à Argentat, et un au fond des gorges du Bés, au Nord de l'Aubrac. Ce rapace ne semble pas avoir encore colonisé les Grands Causses.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*).

Cinq observations de près dans d'excellentes conditions de visibilité dont je ne retiens évidemment que les ♂♂ : un ♂ en Aubrac, près du Buisson ; un ♂ sur le C. de Sauveterre à la Fâge ; un couple à la Croix de Maître Vidal, la ♀ pourchassait un Epervier (*Accipiter nisus*) ; un ♂ près de Dargilan (C. Noir).

Busard cendré (*Circus pygargus*).

Neuf observations de ♂♂, dont une petite colonie de 4 couples dans une région marécageuse boisée près de Maurines, au-dessus des gorges du Bés.

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaëtus gallicus*).

Espèce bien représentée dans toute la région prospectée. Aubrac : en quittant Chaudessaigue (entre le col de Bonnecombe (1.361 m) et les Salces, versant méridional descendant vers le Lot). Causse de Sauveterre : un couple sur le plateau vers la Pigière ; un couple chassait à la Croix de Maître Vidal à 1.486 m presque au-dessus de ma cache et son cri « kiiio kiiio » très aigu et fort fit venir aussitôt de très loin son partenaire. Causse Méjean : au-dessus de Meyrueis, 2 individus. Causse

Noir : un sujet dans les environs de Millau. Causse de Larzac : 2 dans la région de Nant ; 2 au col de Pierre-Plantée, au-dessus de Saint-Jean-de-Bruel (1.000 m) ; 2 à Saint-Eulalie-de-Cernon. L'Aigoual : 2 à Valleraugue, 1 à Lespérou.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*).

Une seule observation dans les gorges de la Jonte près de Meyrueis et celle d'un sujet portant une proie à l'autre extrémité de la même gorge, au Truel, près du Rosier, le même peut-être.

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) et **Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*).

Un couple de Guignettes sur le bord d'un lac artificiel, en Aubrac, près du Buisson, en compagnie d'une Echasse.

Guifette noire (*Chlidonias niger*).

Une observation en Aubrac, au lac de Souveyrol.

Pigeon colombin (*Columba oenas*).

Un couple dans les bois du château de la Baume, en Aubrac.

Pic noir (*Dryocopus martius*).

Dans la montagne de Lespérou, sur le versant méridional surplombant la Dourbie naissante, un garde forestier me signala la capture d'un sujet en septembre 1965 et une rencontre récente dans un secteur où il effectuait le marquage. Quelques heures de recherches me permirent de voir cet oiseau qui, alors que je cheminai dans un sentier, partit dans mon dos, tournant curieusement la tête vers moi me laissant admirer sa calotte rouge et entendre son vol vrombissant caractéristique. Quelques minutes après il émit un cri « hou hou hou » à deux reprises. L'imitation facile de ce cri le fit revenir au-dessus de moi. Une prospection rapide dans ce tènement de hêtres, de pins, de mélèzes, de mauvaise venue ne me permit pas de trouver de loges caractéristiques, mais des épluchures d'écorces importantes, le long de pins desséchés.

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*).

Une seule observation en plein centre du Causse de Sauveterre entre le village du même nom et le col de Montmirat. J'ai été étonné de ne point entendre le chant dans des déserts pourtant très favorables.

Mésange noire (*Parus ater*).

Si je note cette espèce, c'est que deux observations m'ont permis de remarquer que cet oiseau semble préférer les cavités autres que celles des arbres. Entre la Volpière et la Parade sur le C. Méjean, un couple apportait des matériaux au nid dans une cavité du talus de la route, et un couple nourrissait dans une cavité de mur de la maison forestière du col du Minier dans le massif de l'Aigoual.

Merle de roche (*Monticola saxatilis*).

L'espèce m'a paru assez fréquente, depuis le premier ♂ vu au col de Néronne (1.242 m) avant le cirque du Falgoux et le Puy-Mary (Cantal), et les 5 observations de Lozère. Un couple au col de Montmirat, jonction du Causse de Sauveterre et du Causse précédant le Mont Lozère. Le ♂ chantait au haut d'un poteau télégraphique et sur les ruines du village de Montmirat. Un couple au Causse Méjean, sur le versant méridional des pentes limitant l'aérodrome du Chanel. 3 couples sur le Causse de Larzac : un, près d'Alzon, dans les éboulis rocheux qui s'étendent, magnifiques, entre Homs et le Luc. Le ♂ effectuait son vol nuptial au-dessus de la route de Sauclières à Alzon (682 m) au point panoramique indiqué sur la carte Michelin. Ce couple fut revu à plusieurs reprises dans un périmètre assez étendu à mes deux passages dans les jours suivants. L'autre, non loin du camp d'Alton avant Vissec sur la route de Blandas. Enfin, le troisième, sur le flanc du Larzac avant Courvertoirade, 1 ♂ nourrissait.

Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*).

Une seule observation le 10 juin, que je retiens parce que nouvelle pour moi, d'une ♀ dans les buissons bordant la route avant Blandas pour piquer ensuite sur les pentes de Navacelle.

Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*).

Sur le Causse Méjean, peu avant le mas Saint-Chély (1.554 m), un ♂ chantait. Il fut, à plusieurs reprises pourchassé par un ♂ de Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*). Au C. de Larzac, sur les pentes de Navacelle, cette Fauvette chantait en 3-4 endroits différents. Son chant permet de la repérer de loin.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*).

Son chant au vol comme une Alouette, sur trois syllabes, me posa quelques problèmes car difficile à repérer. Je l'ai noté et observé de près en plein centre du C. de Sauveterre ; sur le C. Méjean, entre Volpière et la Parade ; sur le C. Noir, près des Mazes par une chaleur torride, sur le Larzac au milieu des éboulis ruiniformes par plusieurs couples (Causse de Campestre).

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*).

Quatre rencontres, en Aubrac, dans un secteur restreint aux alentours des gorges du Bés, versant Nord du Causse, descendant en pente douce vers la Truyère. Un couple nourrissait des jeunes déjà grands ; il attaquait furieusement Pies et Choucas passant à proximité du gros hêtre où se tenait la nichée. Un second couple avant Maurines et un troisième dont le nid contenait 4 œufs sur le Causse d'Arzene. Hors de cette région, une observation au Point Sublime, Causse de Sauveterre, au-dessus des gorges du Tarn.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*).

Aubrac : rive Nord du Bés, un couple nourrissait. C. Noir : une observation. C. de Larzac : un sujet sur le C. Bégon et 4 rencontres dont 2 couples sur le Causse de Blandas.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*).

La plus abondante des trois sans cependant être très fréquente, je l'ai noté sur chaque Causse. C. de Sauveterre : 3 observations. C. Méjean : une seule. C. Noir : 4 rencontres. C. de Larzac : 6 observations au moins. A souligner, aucune observation en Aubrac.

Étourneau (*Sturnus vulgaris*).

Quelques rares sujets adultes et des jeunes, uniquement en Aubrac, autour du château de la Beaume.

Venturon montagnard (*Carduelis citrinella*).

En Aubrac. Vérifiant d'un coup de jumelles une petite troupe de Fringilles picorant en bordure de la route de Malbouzon,

aussitôt après le Py, j'ai eu la surprise de reconnaître 4 Venturons que je retrouvais peu après sur les pentes d'une prairie voisine becquetant des débris de farine à l'entour d'une auge en bois au pied d'un bloc de rocher. Assez confiants, 2 couples revenaient constamment à ce même point, ce qui me permit plusieurs photos probantes. A quelques kilomètres de là, près des bois de résineux qui entourent le parc du château de la Beaume, j'observais à nouveau 3 fois un couple et quelques isolés. La ♀ est nettement plus terne. A noter que J. C. ROCHÉ l'a enregistré à Chanac (disque 12, face 1, Europe Sud) à 30 km environ au Sud à vol d'oiseau.

Serin cini (*Serinus serinus*).

D'une abondance frappante dans des secteurs inattendus, je dirais presque aussi abondant que le Rossignol (*Luscinia megarhynchos*) ce qui n'est pas peu dire. Le temps est déjà loin où cet oiseau était inféodé aux parcs et aux cimetières... A titre d'exemple, j'ai noté 6 chanteurs à Aluech, hameau de quelques feux, sans route d'approche, en plein centre du Causse Noir, îlot de quelques arbres, sans résineux, au centre d'un désert. Sur le Causse de Blandas, au bord d'une « Lavogne », plusieurs venaient boire en fin d'après-midi en compagnie d'Ortolan, de Zizi, de Chardonneret, de Linotte, de Choucas.

Bruant proyer (*Emberiza calandra*).

Une rencontre à 1.000 m, au col de la Pierre Plantée à l'entrée du C. Bégon, un ♂ chantait. Dans un périmètre restreint les Bruants jaune (*E. citrinella*), fou (*E. cia*), ortolan (*E. hortulana*) et zizi (*E. cirrus*) furent notés.

Moineau soulcie (*Petronia petronia*).

Une bonne observation prolongée et de très près sur le Causse Bégon, au-dessus de Saint-Jean-du-Bruel, de 3 sujets picorant dans les graminées de bordure d'un sentier. Pas revu dans les environs.

*La Chapelle Basse-Mer
(Loire-Atlantique)*
